Isolement/quarantaine pour la population

Il n'existe actuellement plus de recommandations systématique. Le bon sens s'applique si l'on a des symptômes évidents de maladie.

[Comment nous protéger \(OFSP\)](#)

Isolement/quarantaine pour les professionnels de santé

Voir [les directives de SwissNoso](#) dont on peut s'inspirer en l'absence de recommandations officielles pour les structures privées.

En résumé : test immédiat si symptomatique (PCR de préférence). Puis, indépendamment du statut vaccinal:

Si COVID-19 négatif

- symptômes légers : travail avec masque/précautions standards
- forts symptômes : laissé à la libre appréciation de la politique de l'institution

Si COVID-19 positif

- symptômes légers et pas de fièvre : domicile pour 48h, puis retour au travail
- symptômes plus graves ou fièvre : domicile. Retour au travail après diminution substantielle des symptômes et pas de fièvre durant 48h.
- asymptomatique : domicile 48h puis retour au travail

Pour le retour au travail, durant 7 jours après l'apparition des symptômes :

- précautions standards +
- masques FFP2 +
- éviter les endroits bondés/manger seul +
- réaffectation si travail avec personnes très vulnérables

Exposition à une personne positive :

- continuer à travailler avec les mêmes précautions préconisées ci-dessus durant 5 jours après le contact +
- auto-surveillance et testing au moindre symptôme.