

Patients vulnérables

Patient vulnérable selon l'OFSP:

- **Age \geq 65 ans**
- Et liste de diagnostics selon: [PDF OFSP \(mis à jour octobre 23\)](#)

Voir aussi l'annexe 7 de l'ordonnance 3 [sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus](#)

Patients avec maladies chroniques à haut risque (vaccination prioritaire)

[voir le tableau 2 des recommandations vaccinales.](#)

Patients très vulnérables à risque d'évolution vers une forme grave (candidats pour traitement prophylactique ou traitement précoce)

[Tiré des recommandations vaccinations par ARNm en CH](#)

- Infection par le VIH avec un nombre de cellules T CD4+ $<$ 200 par μ l
- Immunodéficiences héréditaires
- Traitement par anticorps monoclonal anti-CD20 ou anti-CD19 ou autres thérapies de déplétion des cellules B (p.ex rituximab (Mabthera), ocrélizumab (Ocrevus) inhibiteurs de la tyrosine kinase de Bruton (par ex. ibrutinib (Imbruvica))
- Traitements immunosuppresseurs (notamment en cas d'utilisation prolongée de glucocorticoïdes $>$ 20 mg d'équivalent prednisone/j): chimiothérapies, inhibiteurs Janus kinase, mycophénolate, ciclosporine...)
- Hémopathies malignes (par exemple, leucémie, lymphome, GVHD ; y compris HSCT autologue et allogénique et CAR-T, myélome multiple, maladies myéloprolifératives) avec neutropénie ($<$ 1'000 neutrophiles/ μ l pendant \geq 1 semaine) ou sous traitement actif ou après HSCT
- Drépanocytose
- Personnes ayant reçu une transplantation d'organe solide
- Chimiothérapies
- Hémodialyse

En cas de doute, prendre contact avec le médecin spécialiste concerné et/ou l'infectiologie du RHNe