

Chirurgie de l'oreille – un aperçu



Dr Nathan Hürzeler

12/09/2024

RHNe

Réseau
Hospitalier
Neuchâtelois

Qu'est-ce qu'il
m'ont fait?

changé osselets
dans mon oreille,
mais je n'ai pas très
bien compri...

2 semaines depuis
opération - ça
saigne toujours -
est-ce normal?





Implant – mais je
ne veux pas avoir
un trou dans le
crâne!


Comment..?
Hein...?
Vous dites...?

Il m'a dit que mes
appareils ne
suffisent plus.














Drain transtympanique





Drain transtympanique









Mastoïdectomie






Mastoïdectomie




Mastoïdectomie

<https://www.youtube.com/watch?v=PFYvKY8xgUQ>









Exérèse cholestéatome



Voie transcanalaire avec atticotomie



Opération radicale modifiée





Exérèse cholestéatome





Exérèse cholestéatome



Exérèse cholestéatome / Tympanoplastie




Interposition d'enclume



PORP: partial ossicular
replacement prosthesis



TORP: total ossicular
replacement prosthesis



Exérèse cholestéatome



PROTOCOLE OPERATOIRE

[redacted] JaYv)

Date opératoire : Début : 16.01.2024 10:05 Fin : 16.01.2024 14:09 Durée : 244 minutes

Opérateurs : Dr Yves Jaquet
Dr Nathan Hürzeler

Assistante : Dre Manon Aeschlimann
Instrumentiste : Mme Sylvie Scheuber


Type anesthésie : Anesthésie générale
Anesthésiste : Dre Patrizia Flaminio

Diagnostic : Cholestéatome attico- antral de l'oreille gauche
Intervention : Opération microchirurgicale de l'oreille moyenne, autre
Atticotomie étendue, et exérèse de cholestéatome attical
Tympanoplastie de type III avec implantation d'une TORP


Codes : Z19.0X.10
Z19.56.10
Z19.53


Indication opératoire :
Cholestéatome attico antrale de l'oreille gauche avec surdité mixte sévère.

Technique opératoire :
Désinfection. Infiltration rétroauriculaire et endaurale à la Rapidocaïne 2% Dre Nadine. Complément de désinfection et champtage. Voie d'abord rétroauriculaire classique. Ouverture du CAE et sous le rebord osseux. Confection d'un lambeau tympanoméatal postérieur. Ouverture de la caisse sous l'annulus postém-






Exérèse cholestéatome







Tympanoplastie












Stapédotomie




Surdité de transmission

BAHA





AMEI



Surdité de perception

Amadé AP
or
Samba AP




Implant actif oreille moyenne

Surdité de transmission

BAHA





AMEI





Implant cochléaire

Surdité de perception






Implant cochléaire



Implant cochléaire




Implant

Surdité de transmission

BAHA





AMEI



Surdité de perception

Implant cochléaire





L'implant se cache
très bien sous les
cheveux et vous en
profiterez!





